

28.

Fusagasugá, 29/11/2021.

Doctora
JENNY ALEXANDRA PEÑALOZA MARTINEZ
Jefe Oficina De Compras
Universidad De Cundinamarca

Asunto y/ó Ref: Alcance aclaratorio ABS F-CD-309

Cordial saludo,

De acuerdo observaciones realizadas por la empresa Ceravi Tecnología SAS del proceso **ABS F-CD-309** que tiene por objeto **“ADQUISICIÓN DE ANIMALES VIVOS PARA LA UNIDAD AGROAMBIENTAL EL TÍBAR SECCIONAL UBATÉ DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA”**. Solicito amablemente se modifiquen las especificaciones técnicas relacionadas quedando de la siguiente manera:

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD |
|------|--|----------|
| 1 | <ol style="list-style-type: none"> Pollas ponedoras de la línea (Hy Line – Brown) entre 16 y 20 semanas de edad con un peso promedio entre 1400 A 1700 g según semana. Con el lote de material biológico se debe anexar plan de vacunación completo con los siguientes biológicos aviarios: <ul style="list-style-type: none"> Vacunas Básicas <ul style="list-style-type: none"> • Marek • Gumboro • Viruela Aviar • Newcastle • Bronquitis Infecciosa • Reovirus Aviar • Coriza Infecciosa • Encefalomielitis Aviar • Coccidiosis Aviar Vacunas adicionales <ul style="list-style-type: none"> • Cólera Aviar • Hepatitis por Cuerpos de Inclusión • Laringotraqueitis Aviar • Influenza Aviar • Metapneumovirus Aviar (A.R.T.) • Colibacilosis Se deben entregar despicadas y vermifugadas | 200 |



| | | |
|---|--|---|
| | 4. Adicional se debe presentar Registro Sanitario de Predio Pecuario ICA vigente del origen de los semovientes. | |
| 2 | <ol style="list-style-type: none">1. Hembras porcinas de reemplazo línea New Cham (habilidades maternas) de 18 semanas de vida aproximadamente con 70 a 85 kg en pie.2. Las hembras deben tener factores genéticos ideales, previstos desde:<ul style="list-style-type: none">• Camadas grandes con lechones uniformes y vigorosos• Bajos costos por lechón destetado• Larga vida productiva de la cerda3. Edad a la pubertad: Se requieren cerdas primerizas que expresen la pubertad antes de los 195 días (o 28 semanas)4. Con el lote de material biológico (porcino) se debe anexar plan de vacunación completo con los siguientes biológicos:<ul style="list-style-type: none">• Leptospira• Síndrome respiratorio y reproductivo porcino PRRS• Parvovirus• Plaeuroneumonia Contagiosa• Circovirus• Erisipela• Micoplasma5. Las hembras se deben entregar vermifugadas6. Adicional se debe presentar Registro Sanitario de Predio Pecuario ICA vigente del origen de los semovientes. | 6 |

Cordialmente,

DAVID ENRIQUE CHAVARRO ARANZALES
Jefe Unidad de Apoyo Académico
Supervisor
Universidad de Cundinamarca

CAMILA ANDREA AREVALO FORIGUA
Profesional II
Supervisora
Universidad de Cundinamarca

Proyectó: Daryl Manjarres.
12.1-14-1